ÖMKi
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Research Institute of Organic Agriculture

ÖMKi ÉLŐ SORKÖZ



FAJGAZDAG SORKÖZTAKARÓ-MAGKEVERÉK SZŐLŐ-ÜLTETVÉNYEKBEN

3 960,-Ft + ÁFA/kg

(10 kg-os kiszerelés esetén)

Életet visz a szőlőbe!

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és partnerintézményei 2012 óta végeznek on-farm vizsgálatokat hazai szőlőültetvényekben az évtizedeken át alkalmazott egyoldalú, talajdegradáló hatású mechanikai sorközművelés kiváltására. Hatéves kutatómunkánk eredményeképp, együttműködésben a Lajtamag Kft-vel, megszülettet az ÖMKi Élő Sorköz magkeverék, mellyel kifejezetten a hazai adottságokhoz illő, fajgazdag sorköztakarást tudunk biztosítani a hazai szőlész-borászok számára.

Vetési idő: ősszel (praktikusan szüretek után), vagy tavasszal, április közepéig. Őszi vetés esetén több ideje, lehetősége van az állománynak a megerősödéshez.

Vetésmélység: 1-3 cm

Javasolt dózis: 20 kg/ha

A keveréket alkotó növényfajok: komlós lucerna, szarvaskerep, fehér here, lándzsás útifű, tarka koronafürt, vadmurok.

www.biokutatas.hu

01 Kizárólag **évelő és nem túl magasra növő növényfajokat** választottunk ki, melyek illeszkednek a szőlőültetvények sajátosságaihoz. Így biztosabban tud kialakulni már az első évre a kellő borítottság.

02 A receptúra megalkotásakor figyelembe vettük, hogy olyan fajok kerüljenek a keverékbe, melyek **több évig fennmaradnak**, eredményesen újravetik magukat, s **Magyarországon honosak.**

03 A fajgazdagság révén az eltérő gyökeresedési típusú, gyökeresedési mélységű növényfajok hozzájárulnak a talajtömörödés csökkentéséhez, **kedvező talajszerkezet kialakulásához, a humusztartalom emelkedéséhez.**

04 A fajgazdag sorköztakarás alkalmazásával a terület **természetvédelmi értékét is növeljük és fokozzuk biodiverzitását.**

05 A takarónövényzet életteret biztosít a hasznos élő szervezetek számára.

06 A technológia nemcsak ökológiai szőlőtermesztésben alkalmazható, de **integrált művelésű ültetvények is sikerrel bevezethetik** és fokozhatják vele fenntarthatóságukat.

07 A gondosan megválasztott takarónövényzet csapadékos időjárás esetén is jól bejárhatóan tartja az ültetvényt, emellett kedvező esztétikai hatást biztosít.

Mire ügyeljünk?

Az ÖMKi Élő Sorköz keverék 10-60 cm mélységből veszi fel a számára szükséges vízmennyiséget. Ez miért fontos? Egy beállt, kellő tőkekondíciójú, idősebb ültetvény esetén jól megfér egymással szőlő és takarónövényzet, anélkül, hogy vízkonkurencia jönne létre.

Ne vessünk viszont új telepítésű ültetvénybe, hiszen a fejlődő oltványokkal versenghetnek a takarónövényzet egyedei, mely befolyással lehet az első év hajtásnövekedésére, de akár az eredési arányra is.

Minden sorközbe? Vagy minden másodikba?

Az ültetvény korára és kondíciójára tekintettel kell lennünk a talajápolási technológia megválasztásakor. Ha bizonytalanok vagyunk, vessünk minden második sorközbe, és az első évi tapasztalatok függvényében döntsünk a köztes sorokról. A köztes sorokban végezhetünk zöldtrágyázást, időszakosan szerves trágyázást, alkalmazhatunk szalmatakarást stb. Megfelelő kor és körülmények esetén minden sorközben alkalmazhatjuk az ÖMKi Élő Sorköz keveréket.

Kérdés esetén keressen minket:

magkeverek@biokutatas.hu

Ápolás

Kaszálás:

A vetést követően, csapadékban szegény időszakban előfordulhat, hogy a gyomfajok magjai kelnek ki előbb. Ilyen esetben ne ijedjünk meg, kb. 10 cm-es tarlómagassággal kaszáljuk le a gyomokat, hogy ne tudjanak magot hozni. A takarónövényünk így meg fog erősödni.

Hengerelés:

A takarónövény állományt hengerelhetjük, ha túl magasnak találjuk. A hengereléshez szinte bármilyen eszköz jó, amivel – jól megválasztott traktor sebesség mellett – a talajra fektethető, óvatosan letörhető a növényzet.

Talajlazítás:

Ősszel alkalmazhatunk késes talajlazítást minden, vagy minden második sorközben. Ez a talaj levegőhöz jutását segíti és hozzájárul az őszi-téli lehulló csapadék mélyebb talajrétegekbe történő vezetéséhez.

Hasznos tanácsok:

Ősszel, praktikusan szüret előtt, magas tarlóval (10-15 cm) lekaszálhatjuk az állományt. Ekkorra már a fajok magot hoztak, ez a tarlómagasság pedig megfelelő a növények átteleléséhez. A kaszálás egyben fellazítja, aprítja a lehengerelt növényi részeket. Ha éveken át csak hengerelünk, az káros hatású lehet a növényzetre. A viszonylag nagy mennyiségű szerves anyag az állomány „befülledését", kikopását eredményezheti, mivel kedvezőtlenné válnak a csírázás körülményei.



ÖMKi-Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
1033 Budapest, Miklós tér 1.
06-1-244-8358 | www.biokutatas.hu